

Discutons Sulcorebutias - 3

Les collections des fans de *Sulcorebutia* se sont enrichies ces dernières années d'une gamme de plantes introduites sous des numéros de collecte de Heinz Swoboda. John Pilbeam examine quelques unes de ces nouvelles introductions. Photographies de Bill Weightman.

* * * * *

***Sulcorebutia mariana* HS 15 collecté par Heinz Swoboda dans le département de Cochabamba, province de Mizque, Bolivie**

Un autre printemps est apparu, et cette année, la plupart de mes *Sulcorebutias* ont répondu au verre le plus clair et le plus propre qu'ils aient jamais eu par une profusion de fleurs. Cela s'est fait parce que l'année dernière, j'ai remplacé ma vieille serre croulante en bois de cèdre par une nouvelle en aluminium. L'effet sur la spination et la couleur des corps a aussi été spectaculaire, la lumière

supplémentaire mettant en relief la coloration sombre des corps et un développement des épines plus fort. Je ne recommande pas vraiment un tel changement drastique pour améliorer la qualité de vos *Sulcorebutias*, mais peut-être un bon lavage des carreaux ...?

Certaines des espèces les plus intéressantes récemment acquises ont fleuri aussi, et certaines commencent à montrer leur spécificité. En particulier, certains numéros de collecte de Heinz Swoboda ont produit quelques belles plantes d'aspects différents, à part que beaucoup de ces numéros que j'ai acquis ne sont simplement que des doublons d'anciennes plantes collectées par d'autres. Mais je ne plains pas car, la récompense de prendre le risque d'avoir des doublons, en vaut la peine quand certains se révèlent être aussi beaux. HS 151 en particulier a produit des fleurs répondant bien à la sombre coloration du corps et à sa spination fine et serrée. Elles sont magenta-pourpre foncé avec une profondeur de couleur que je n'ai vue que chez certaines petites formes de *S. crispata* (KK 1266 et autres).

Il est regrettable que cette découverte de Swoboda extrêmement prisée n'ait pas encore été décrite. Son compagnon HS 152, de Bolivie, département de Cochabamba, province de Campero, a été décrit comme *S. augustinii* par Hentzschel dans le journal de la société belgo-néerlandaise, *Succulenta* 68 (7/8) :145-153 (1989). *S. augustinii* est aussi une plante de couleur magnifiquement sombre avec de fines épines en dents de peigne (crème par rapport au noir de HS 151) et avec la même fleur magenta-pourpre foncé que HS 151. Il est fait référence, dans la description originale, au HS 151 voisin et également au HS 100 de plus forte croissance qui a des épines plus longues et une fleur d'une couleur plus claire avec la gorge blanche. Du point de vue d'un collectionneur, ces trois-là méritent d'être recherchés mais avec quatre années passées maintenant depuis la description de *S. augustinii*, il semble que ces deux-là soient condamnés à jouer les seconds rôles ; ils méritent mieux.

Il n'en va pas de même avec HS 15, une collecte plus ancienne, du département de Cochabamba, province Mizque, qui a été décrite par Swoboda comme *S. mariana* dans le même journal plus tôt dans la même année (*Succulenta* 68 (1) :1,3-8 .1989). Il a aussi un corps court de teinte sombre, une spination pectinée, mais avec des fleurs rouge clair. Il vient aussi de fleurir, et c'est encore une plante d'aspect très particulier.

Il existe des versions à fleurs blanches disponibles ou signalées d'un certain nombre d'espèces, y compris *S. crispata*, *S. flavissima*, *S. breviflora* et *S. cylindrica*. Les deux derniers sont bien sûr déjà connus avec des fleurs magenta ou jaunes. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir des fleurs sur mes plantes à fleurs blanches de *S. flavissima* et *S. breviflora*, mais *S. crispata* et le soi-disant *S. cylindrica* à fleurs blanches, HS 44a, m'ont remercié en abondance. Les plantes acquises de HS 44a se sont révélées anormales, et l'application de ce nom est pour le moins discutable. J'ai vu



***Sulcorebutia* sp.
HS 151 - associé à
*S. augustinii***



également que l'on s'y référerait en tant que *S. vizcarrae* à fleurs blanches, il forme un plus grand corps, plus globulaire, rejetant plus tôt que normalement chez *S. cylindrica*, et les épines sont beaucoup plus fortes également.

J'ai deux versions distinctes de HS 44a. La première, qui a fortement grandi jusqu'à 10cm de haut et 8 cm de large et rejette déjà, a de fortes épines blanches très fort dans l'habitude de *S. vizcarrae*, et il a produit une multitude de fleurs blanc nacré, claires, sans aucune autre touche de couleur dans les pétales. L'autre est une plante

à épines plus foncées, une croissance plus lente et plus faible, jusqu'à présent du moins, avec des fleurs d'une délicate nuance de rose pâle. Chacune mérite sa place à la maison.

Pour en revenir à HS 152, *S. augustinii*, j'aurais aimé inclure une photo de cette espèce en fleur aussi, et je le ferai un jour. Le mien est maintenant dans un petit pot de 13 cm et pousse bien avec à présent une cinquantaine de têtes, mais encore aucune fleur : suis-je le seul à avoir des difficultés à faire fleurir cette espèce ?



***Sulcorebutia* sp.
HS 44a
Distribué comme une
forme de *S. cylindrica*
à fleurs blanches ou
est-ce une forme de
S. vizcarrae ?**

Originellement publié dans **The Cactus File** 1993 Volume 1 N° 10 (p. 12-13)

© **The Cactus File**

Reproduit avec la permission de l'auteur

Traduction de Sulco-Passion