Nachtrag zu « Morphologische Studien an gelbblütigen Sulcorebutien »

Von *A. J. Brederoo*

Wie im vorigen Informationsbrief angekündigt, erscheinen hiermit die beiden Zeichnungen S. mentosa und S. langerii zum oben genannten Beitrag von A. J. Brederoo.




KK1206 4X
WR276 4X
4X
KÖHRES
10X
4X
5X
3X
20X
20
30X
S. MEN. SP. AIQUILE

Dieser Artikel wurde ursprünglich in der Zeitschrift

ZAG Echinopseen 7-1985 (S. 18-20) veröffentlicht

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors und Verlages

Sie können das ganze Heft downloaden von der "Kakteen- und Sukkulenten-Bibliotheek" der Website "Au Cactus Francophone".
http://www.cactuspro.com/biblio/de:echinopseen

Informationsbrief 7 / 1985

Aus dem Inhalt:

Mikroskopische Untersuchungen an Samen der Gattung Lobivia - Der Formenkreis um Lobivia cinnabarina — G. Köllner

Lobivia tarabucensis und Lobivia yamparaezensis - zwei Formen der Lobivia cinnabarina — E. Herzog

Der Sulcorebutia-verticillacantha-Formenkreis — R. Weber

Nachtrag zu: Morphologische Studien an gelbblütigen Sulcorebutien — A. J. Brederoo

Weitere Beiträge in den Rubriken:

Biologische Arbeitstechniken - praktische Erfahrungen
Aus der Literatur
Literatur-Rückblende
Mitteilungen der ZAG

http://www.cactuspro.com/biblio_fichiers/pdf/Echinopseen/Hefte/Infobrief%201985-07%20ZAG.pdf