

## Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov.

WALTER RAUSCH

**Simplex**, plane-globosa, ad 6 cm alta et 10 cm diametens, clare-glauca, saepe violaceosuffusa; **costis** ad 20, spiraliter tortis, in gibberes 15 mm longos et ad 10 mm altos dissolutis; **areolis** ad 12 mm longis, cuneatis, apice ad 4 mm latis, deorsum fastigatis, albo-tomentosis; primo **aculeis marginalibus** ca. 16 et **centralibus** ad 4, deinde aculeis marginalibus et centralibus difficulter distinguendis, ad 28, ad 12 mm longis, divaricatis, subarcuatis, pungentibus, flavis basi incrassate subfusca. **Floribus** 35 mm longis et diametentibus; **ovario et receptaculo** aurantiaco squamis viridibus tecto; **phyllis perigonii** exterioribus vinosis, fusco-viridi-acuminatis, interioribus atro-vinosis; **fauce** rosea, **filamentis** ab ovario insertis obscure-roseis, **stylo et stigmatibus** (6) luteis.

**Patria:** Bolivia, a Totorá (Chijmore) meridiana regione, 2900 m alt.

Typus Rausch 465 in Herbario W.

**Plant** enkel, platronnd, tot 6 cm hoog en 10 cm diam., lichtgrijs-groen, metaalachtig, dikwijls ook violet getint.

**Ribben** tot 20, spiraalvormig verlopend in 15 mm lange en tot 10 mm hoge knobbels.

**Areolen** tot 12 mm lang, wigvormig, bovenaan tot 4 mm breed en naar beneden spits toelopend, met wit vilt.

**Randdoorns** aanvankelijk ca. 16 en tot 4

**middendoorns**, later beide moeilijk te onderscheiden, tot 28, tot 12 mm lang, gespreid, iets gebogen, stekend, lichtgeel met verdikte, bruinachtige voet.

**Bloem** 35 mm lang en breed; pericarpellum en receptaculum oranje-bruin met groene schubjes: buitenste perianthbladeren wijnrood met bruingroene punt; binnenste perianthbladeren donker wijnrood; keel rose; meeldraden direct boven het pericarpellum beginnend, donkerrose; stijl geel; stempels 6, geel.




Sulcorebutia oenantha Rausch spec. nov.

Foto: Rausch

**Groeiplaats:** Bolivia, ten zuiden van Totorá (Chijmore) op 2900 m.

**Typus** Rausch 465 in herbarium W.

Deze vormgroep valt op door zijn relatief hoge knobbels en door zijn vorm, die sterk doet denken aan het genus **Weingartia**.



*Sulcorebutia oenantha* Rausch spec. nov.

Foto: Rausch

---

Dit artikel werd in **Succulenta** 50:6 (1971) (bldz. 112-113) gepubliceerd.

Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.

---