

Sulcorebutia caniqueralii (Cardenas) Buining & Donald

Eerstbeschrijving in *The Cactus & Succulent Journal of Great Britain* 27:57 aflevering 3, 1965.

Synoniem: *Rebutia caniqueralii* Cardenas

Cactus & Succulent Journal of America 36:26, aflevering 1, 1964.

Lichaam spruitend, heeft een tamelijk dikke en lange penwortel, de stekken zijn 1 cm lang en 2 cm in doorsnee. De kleur is grauw-groen. Ribben zijn in ongeveer 13 spiraalvormige rijen van kleine buitjes opgelost, deze zijn 3-4 cm breed. De areolen zijn elliptisch, smal, 3 mm lang, wit van kleur. De doorns staan in kamvorm op het lichaam, 11-14 in getal, en zijn borstelachtig, 1,5-2 mm lang, witachtig. Basis bruin, de middendoorns staan afstandig van de andere doorns, 1-2 vaak in de areolen opgericht staand; bloembuis roodachtig tot geel, groengesclubd, sepalen bruingeel, petalen 2 cm lang, van onderen geel, en boven oranje; meeldraden goudgeel; steel groenachtig van kleur stempels 8, helgeel. Bloem tot 4 cm in doorsnede. Ovarium groengesclubd.

Sulcorebutia caniqueralii komt oorspronkelijk uit Bolivia (departement Chuquisaca) provincie Oropeza, Sucre, 2800 m hoogte. De plant is genoemd naar pater Caniqueral, die deze plant het eerst heeft gevonden.

De overgang van de bloemkleur is zeer variabel. Deze soort is wellicht één van de mooiste *Sulcorebutia*'s. Er schijnen planten met groene en met bruine knoppen voor te komen. Bij de planten met een bruine knop zou de bedoorning iets korter zijn dan bij de andere vorm.

Donad geeft Tarabuco-Zudanez, op 2800 m hoogte als vindplaats aan.

Deze plant is verspreid onder de veldnummers WR 281, Kr 217 en V 596. Literatuur C.

Backeberg: *Das Kakteenlexikon*.

Kari-Heinz Brinkman: *Sulcorebutia*.



Dit artikel werd in **Succulenta** 57- 12 (1978) (bldz. 270-271) gepubliceerd.
Overgenomen met de toelating van de schrijver en de uitgever.
